

# کرنال بنت گندم

لاترک تنب *Tilletia indica*



Ruben Durán, Washington State University, Bugwood.org



CIMMYT

محدودیت‌ها	کنترول مستقیم	کنترول	بررسی	جلوگیری
<ul style="list-style-type: none"> <li>در وقت محلول پاشی از خوردن، نوشیدن و سگرت کشیدن خود داری نمائید</li> <li>همیشه در وقت دوا پاشی لباس محافظتی را بپوشید، دوز، وقت تطبیق و وقت قبل از رفع حاصل را از روی لیبل تعقیب کنید</li> <li>در اثنای محلول پاشی حیوانات ار از ساحه دور نگهدارید</li> <li>بعد از محلول پاشی بدن را شسته ئو لباس تانرا تبدیل نمائید</li> <li>آفتکش‌ها را دایم از دسترس اطفال دور نگهدارید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تداوی بذری با تیرام 2 گرام بر فی کیلو گرام تخم</li> <li>تداوی بذری با کاربوکسین 2 گرام بر فی کیلو تخم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سرف جمع اوری خوشه های مصاب از مزرعه به بسیار دقت صورت گیرد تا سپور یا تخم شان در مزرعه تیت نشود وبسیار دقت کنید که خوشه مرضی را کشیده و در خریطه پلاستیکی و کاغذی بگذارید</li> <li>خوشه های مرضی را دور از ساحه از بین ببرید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراقبت را در طول فصل نموئی دوبا انجام دهید: یکبار در مرحله خوشه و یکبار در مرحله نزدیک پختگی</li> <li>در مرحله رفع حاصل معمولاً مشاهدات را انجام دهید</li> <li>دانه های را که به رنگ نسواری و سیاه است دور کنید</li> <li>خوشه گندم را گرفته و دانه های انرا تحت مطالعه قرار میدهم که علایم را از خود نشان میدهد و قسماً دانه ها خوب دقیق مشاهده نمائید</li> <li>خوشه مرضی نبات نظر میباشد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استفاده از وراثتی مقاوم مانند 09- چنت و کوشان</li> <li>تناوب زراعتی با نباتات پلی دار مانند لوبیا و یا نخود عوض گندم به مدت 2-3 سال</li> <li>تغیر وقت کشت جلوگیری از رطوبت زیاد. کشت از وقت معمول 15-20 قبل صورت گیرد.</li> <li>در صورت رطوبت زیاد زمین ابیاری کم صورت گیرد</li> <li>تخم ریز را از 28 کیلو فی جریب زیاد نکنید. در صورت غلو بودن رطوبت هم بیشتر میشود</li> <li>جمع آوری بقایای نباتی در فصل نموئی و خودر خوب متیقین سازید که مرض زمستان را در این سپری نمی کند</li> <li>تنها تخم پاک کشت کنید. و آنرا در آب بگذارید و مرضی سر آب میشود و آنرا دور نمائید</li> <li>جلوگیری از انتقال تخم های مرضی به ساحات پاک از مرض</li> <li>عمیق قلبه کردن و یخ آب دادن</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>تیرام در صنف دوم سازمان صحن جهان شامل است زهریت متوسط دارد، گرد زیاد از 15% استفاده نگردد</li> <li>در صنف سوم سازمان صحن جهان شامل است کم خطر است مخت را در خریطه مرطوب یک هفته قبل از کشت جای بجای نمود</li> </ul>				

## Afghanistan

ایجاد شده/ درست کردن: July 2014, revised 2015

نویسنده: عبدالغفور بابری

تصحیح کننده: Plantwise

