

# آم کے پھل کی مکھی

*Bactrocera dorsalis*



Mango fruit fly adult.  
Photo by Clive Lau

بچاؤ کی تدابیر	معائنہ	براہ راست انسداد	براہ راست انسداد	پابندی
<ul style="list-style-type: none"> <li>پھل کو اُتارنے سے دو ہفتے پہلے خاکی لفافوں سے لپیٹ دیں۔ یاد! رہے ایسا صرف چھوٹے قد کی اقسام کی صورت میں کریں۔</li> <li>گرے ہوئے پھل کو پورے سیزن کے دوران اکٹھے کر کے باہر لے جا کر تلف کرتے رہیں۔</li> <li>درختوں کے نیچے گوڈی کریں تاکہ زمین میں موجود سنڈیاں باہر نکل آئی اور دھوپ، پرندوں اور کیڑے کھانے والے جانوروں کے ذریعے تلف ہو جائیں۔</li> <li>دپر سے پھل اُٹھانے والی اقسام جلدی پھل اُٹھانے والی اقسام کی نسبت پھل کی مکھی کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>گرم موسمی حالات پھل کی مکھی کی بڑھوتری کے لیے زیادہ سازگار ہیں۔</li> <li>اپریل کے بعد آم کے پودوں کے نیچے کی مٹی ہفتہ میں دو مرتبہ ضرور چیک کریں۔ مٹی کھود کر ایک سے 2 انچ نیچے پھل کی مکھی کی سنڈیاں تلاش کریں۔ یہ سرخی مائل بھورے رنگ کی تھیلیوں میں موجود ہیں جس کا سائز گندم کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔</li> <li>اپریل کے بعد میتھائل یو جی نال والے جنسی پھندے 4 فی ایکڑ نصب کریں۔</li> <li>اگر ممکن ہو سکے تو چھوٹی بھڑوں کے ذریعے پھل کی مکھی کو کنٹرول کریں۔ مگر یہ طریقہ آپ کے لیے موجود سال کے بجائے آئندہ سال فائدہ مند ثابت ہو گا۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>متاثرہ پھلوں کو درخت اور زمین سے اکٹھا کر کے تلف کر دیں۔</li> <li>پورے سیزن کے دوران متاثرہ پھل اکٹھے کرنے کے بعد دھوپ میں رکھتے رہیں۔</li> <li>پورے سیزن کے دوران میتھائل یو جی نال والے جنسی پھندے 4 فی ایکڑ نصب کریں۔</li> <li>اگر ممکن ہو سکے تو چھوٹی بھڑوں کے ذریعے پھل کی مکھی کو کنٹرول کریں۔ مگر یہ طریقہ آپ کے لیے موجود سال کے بجائے آئندہ سال فائدہ مند ثابت ہو گا۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کیمیائی زہروں (کیڑے مار زہریں، جڑی بوٹی مار زہریں، پھپھوندی کش ادویات) کو استعمال کرنے سے پہلے لیبل پر دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیں۔ سپرے کے دوران ہاتھوں پر ربڑ کے لمبے دستانے، سر پر پگڑی/ٹوپی، آنکھوں پر عینک (Goggles) اور چہرے پر ماسک لگائیں۔ سپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ سپرے مکمل کرنے کے بعد دن کے آخر میں اچھی طرح نہائیں۔ استعمال کے بعد سپرے کے خالی ڈبوں کو زمین میں گہرا گڑھا کھود کر دبا دیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کی مصنوعات ڈبلیو ایچ او کلاس کے تحت ہے "U"، شدید خطرہ پیش کرنے کے قابل نہیں</li> <li>جب پھل کی مکھی کا حملہ 50 پھلوں میں سے ایک سے زیادہ پھلوں پر تو تو سپرے کریں۔</li> <li>پھل اُتارنے سے 2 ہفتے پہلے تک سپرے مکمل کر لیں۔</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>عال اجزاء GF-120 : اسپینووساد : 0.5 لیٹر + پانی: 3.5-4.5 لیٹر اور میتھائل یو جی نال کے 4 سے 5 قطرے ڈال کر ایک محلول تیار کریں۔ اس محلول میں پٹ سن کی بوری بھگو کر کھیت میں رکھیں۔</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>فیرومون ٹریپ (جنسی پھندے) کے اندر پروٹین بائیڈرو لیز + GF-120 (فعال اجزاء : اسپینووساد) : 0.5 لیٹر + پانی: 3.5-4.5 لیٹر ڈال کر مادہ پھل کی مکھی کو مارنے کے لیے طعمے (Baits) کے طور پر استعمال کریں۔</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>حملہ شدہ پودوں پر GF-120 فعال اجزاء : اسپینووساد : 0.5 لیٹر + پانی: 3.5-4.5 لیٹر کل محلول 4-5 لیٹر ہونا چاہئے، 0.5 لیٹر کا 0.5 لیٹر 3.5-4.5 لیٹر پانی میں شامل کیا جانا چاہئے۔ (یہ حل ایک ایکڑ سپرے کے لئے ہے)</li> </ul>	



## Pakistan

تخلیق کردہ/تیار کردہ/تجدید: June 2013  
مصنّفین: Muamaza Pest Warning and Quality Control of  
Pesticides: Lahore  
ترمیم: Plantwise