




Vírus da roseta do amendoim

Groundnut rosette virus Clorose da roseta do amendoim

	Prevenção	Monitoramento	Controle direto
 <p>Tamanho da planta reduzido (direito) em comparação com a planta saudável (esquerda) (CABI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione sementes limpas e saudáveis para plantação • variedades resistentes às plantas • O vírus é transmitido pelo áfido <i>Aphis craccivora</i>; Controle os pulgões no campo (consulte Controle direto) • Semeie o amendoim cedo (assim que houver suficiente água no solo), para que a planta possa começar a florescer antes que os pulgões apareçam • Pratique um espaçamento próximo entre as plantas (altas densidades de plantas, 50 cm x 20 cm) • Não cultivar amendoim no mesmo solo há mais de um ano; Rotde com milho, sorgo, etc. • Intercalar com feijão e sorgo • Remover plantas voluntárias de amendoim e hospedeiros alternativos (por exemplo: <i>Euphorbia</i> spp.) do campo 	<ul style="list-style-type: none"> • Procure sintomas regularmente começando duas semanas após o plantio. Os sintomas variam dependendo da infecção: <ul style="list-style-type: none"> • Folhas: amarelecimento, murchas e mosaico, folhas mais pequenas • Tamanho da planta reduzido • Brotos: distorção • Folhas mais antigas: verde escuro, tamanho reduzido e mostra rolamento descendente de margens de folheto • Procure por exsudados preto ou castanho escuro produzido por pulgões em folhas jovens, caules, flores e cavilhas • Controle os pulgões logo que os veja, ou quando você vê os sintomas do vírus 	<ul style="list-style-type: none"> • Remova plantas infectadas e ervas daninhas e queimem, enterrem ou compostem • Controle de pulgões: <ul style="list-style-type: none"> • Libertar inimigos naturais, como vespas parasitas (por exemplo, <i>Entomophthora</i> sp.) Ou predadores (por exemplo, larvas de sírfidos ou coccinelídeos) • Use armadilhas pegajosas amarelas para atrair e matar pulgões • Misture 1 colher de sopa de sabão para lavar louça com 4 litros de água. Pulverize no início da manhã ou no final da tarde, 2-3 vezes em intervalos de 3-4 dias • Espalhe cinzas uniformemente sobre partes infestadas da planta
 <p>Padrão de amarelamento e manchas nas folhas (Scottish Crop Research Institute)</p>			
 <p>Distorção da raiz (Swathi Sridharan)</p>			

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a sua utilização.