

Capim-pé-de-galinha

Eleusine indica



E. indica mudas (Chris Parker, Bristol, Reino Unido)



E. indica rebento (Chris Parker, Bristol, Reino Unido)



E. indica hábito de crescimento (S.D. Sawant)

Prevenção	Monitoramento	Controle direto
<ul style="list-style-type: none"> • Compre semente certificada e alimentos para animais para reduzir as chances de contaminação • Como as sementes podem ser transportadas por animais e máquinas, não permitam animais numa área afetada, limitar o uso da maquinaria na área e mantenham a maquinaria limpa para evitar propagação • Mantenha a cultura saudável para maximizar a competitividade - use níveis ideais de água e fertilizantes • Para pastagem, incentive uma boa cobertura de relva, pois a relva pode superar a erva daninha. Limite a quantidade de pastagem em uma área específica: <ul style="list-style-type: none"> • Forneça múltiplos pontos de rega para evitar a congregação de gado • Gire o gado entre o cercado 	<ul style="list-style-type: none"> • Relva anual em forma de tufo, espalhando-se ou fica em linha reta, com até 40 cm de altura • Plântulas: a primeira folha é de cerca de 1 cm de comprimento, pontiaguda, pode ficar plana no solo • Folhas: verde claro; suave; Plano em forma de V; Até 8 mm de largura, 15 cm de comprimento • Flores: dispostas em aglomerados de 3-5 • Sementes: castanho avermelhado a preto; oblongo; rebordo; Cerca de 1 mm de comprimento • Raízes: sistema centralizado; Muito forte quando maduro • Espalha-se ao longo de habitats perturbados, como estradas e corredores elétricos. Procure nas lagoas, rios e costas 	<ul style="list-style-type: none"> • Remova à mão se a erva é menor que 5-8 cm de diâmetro. Use uma enxada se a remoção for difícil. A remoção fica mais difícil à medida que a erva cresce (o sistema de raízes é mais forte) • Lavre a terra. A erva cresce melhor em solos compactos e mal drenados, então certifique-se de que é arejado e drenado • Use solarização (estolho vegetal e cobertura com polietileno transparente ou similar) para matar sementes de ervas daninhas até 5 cm • Use o jornal desfiado como estolho em campos de tomate • Use uma cultura de cobertura de centeio - seus resíduos devem suprimir a erva daninha

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a sua utilização.